§3. Пропорциональные отрезки

Задачи данной темы довольно часто встречаются на вступительных экзаменах и, чтобы избежать использования (без доказательства) теорем Чебы и Менелая при их решении, удобно, например, рассмотреть полезную задачу и метод ее решения, который пригодится при решении не только планиметрических, но и стереометрических задач.

Основная задача.

Рис. 1

В треугольнике ABC (рис. 1) из вершин A и B к сторонам BC и AC , соответственно, проведены отрезки AD и BE , делящие эти стороны в заданном отношении, т.е.

$$\frac{BD}{DC} = \frac{m}{n}, \quad \frac{AE}{EC} = \frac{p}{q}. \quad (1)$$

Определить, в каком отношении делятся эти отрезки точкой их пересечения, т.е. найти отношения:

$$\frac{AQ}{QD} \text{ и } \frac{BQ}{QE}.$$

Иными словами, известно, в каком отношении отрезки AD и BE делят противоположные вершинам A и B стороны треугольника; требуется определить, в каком отношении они делятся между собой.

Оказывается, что эти отношения не зависят ни от вида треугольника, ни от его сторон, ни от его углов, а определяются лишь отношениями, в которых делятся соответствующие стороны треугольника точками D и E , т.е. пропорциями (1).

Решение. Найдем сначала первое из искомых отношений. Для этого выполним одно вспомогательное построение и несколько стандартных шагов, характерных при решении задач подобного типа.

- 1) Проведем прямую $AB' \parallel BC$ (рис. 2) и обозначим длину отрезка AB' через a , т.е. $AB' = a$.
- 2) Рассмотрим подобные треугольники AEB' и CEB (рис. 3), причем коэффициент подобия равен $\frac{AE}{EC} = \frac{p}{q}$, тогда $\frac{AB'}{BC} = \frac{AE}{EC} = \frac{p}{q}$ и $BC = \frac{q}{p}a$.

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

- 3) Используя затем первую из пропорций (1), находим:

$$BD = \frac{m}{m+n} BC$$

или

$$BD = \frac{m}{m+n} \cdot \frac{q}{p} \cdot a.$$

- 4) Из подобия треугольников $AB'Q$ и DQB (рис. 4) находим:

$$\frac{AQ}{QD} = \frac{AB'}{BD} = \frac{\frac{a}{m+n} \cdot \frac{q}{p} \cdot a}{\frac{q}{p} \cdot a} = \frac{p}{q} \left(1 + \frac{n}{m}\right).$$

Таким образом, $\frac{AQ}{QD} = \frac{p}{q} \left(1 + \frac{n}{m}\right)$

Аналогично находится отношение $\frac{BQ}{QE} = \frac{m}{n} \left(1 + \frac{q}{p}\right)$.

Рассмотрим несколько примеров.

Задача 1. В треугольнике ABC длины сторон AB , BC и AC относятся как 2:4:5, соответственно. Найти, в каком отношении делятся биссектрисы внутренних углов треугольника точкой Q их пересечения.

Решение.

Рис. 5

Используя свойство биссектрисы делить противоположную сторону треугольника на части, пропорциональные заключающим ее сторонам, находим (рис. 5):

$$\frac{AE}{EC} = \frac{2}{4}, \frac{BD}{DC} = \frac{2}{5}, \frac{AG}{GB} = \frac{5}{4}.$$

Используя затем результаты решения основной задачи, получаем

Ответ: $\frac{BQ}{QE} = \frac{6}{5}, \frac{AQ}{QD} = \frac{7}{4}, \frac{CQ}{QG} = \frac{9}{2}.$

Рассмотрим теперь решение задачи, которую можно назвать обратной по отношению к рассмотренной выше. Основной ее вопрос можно сформулировать следующим образом: найти, в каком отношении отрезки AD и BE , проведенные из вершин A и B треугольника ABC к сторонам BC и AC , соответственно, делят эти стороны, если известно, в каком отношении отрезки AD и BE делятся между собой?

Обратная задача. В треугольнике ABC проведены отрезки AD и BE , пересекающиеся в точке Q (рис. 1) так что известны отношения:

$$\frac{AQ}{QD} = a, \frac{BQ}{QE} = b.$$

Найти, в каком отношении делятся стороны AC и BC точками E и D , т.е. найти отношения:

$$\frac{AE}{EC} \text{ и } \frac{BD}{DC}.$$

Решение. Воспользуемся результатами решения основной задачи. Обозначим искомые отношения через p/q и m/n , соответственно. Тогда имеем систему уравнений:

$$\begin{cases} \frac{p}{q} \left(1 + \frac{m}{n}\right) = a \\ \frac{m}{n} \left(1 + \frac{q}{p}\right) = b \end{cases}$$

Перепишем эту систему в виде:

$$\begin{cases} 1 + \frac{m}{n} = a \frac{1}{p/q} \\ 1 + \frac{q}{p} = b \frac{1}{m/n} \end{cases} \text{ или } \begin{cases} a \frac{1}{p/q} - \frac{1}{m/n} = 1 \\ -\frac{1}{p/q} + b \frac{1}{m/n} = 1 \end{cases}$$

Отсюда легко находятся искомые отношения, а именно:

$$\frac{p}{q} = \frac{ab-1}{1+b}, \frac{m}{n} = \frac{ab-1}{1+a}.$$

Очевидно, что решение обратной задачи существует при условии $ab > 1$.

Также в данной теме при решении задач бывает полезно использовать некоторые свойства площади.

- 1) На стороне BC треугольника ABC выбрана некоторым образом точка D , тогда $\frac{[ABD]}{[ADC]} = \frac{BD}{DC}$ (рис. 6).

Рис. 6

Рис. 7

- 2) На сторонах AB и AC треугольника ABC выбраны некоторым образом точки D и E соответственно, тогда $\frac{[ADE]}{[ABC]} = \frac{AD}{AB} \cdot \frac{AE}{AC}$ (рис. 7).

Задача 2. В треугольнике ABC $AB = 10$, $BC = 12$, $AC = 8$. На отрезке AB взята точка K так, что $AK:KB = 2:3$, а на стороне BC – точка M так, что $BM:MC = 2:1$. На отрезке KM взята точка O так, что $KO:OM = 4:5$. Площадь какого из треугольников ABO , BCO или ACO является наименьшей?

Решение.

Рис. 8

- 1) Пусть $[AKO] = s$, тогда по свойству площадей (одинаковые высоты, различные основания) имеем:

$$\frac{[BKO]}{[AKO]} = \frac{3}{2}, \text{ тогда } [BKO] = \frac{3}{2}s;$$

$$\frac{[BOM]}{[BKO]} = \frac{4}{5}, \text{ тогда } [BOM] = \frac{5}{4}[BKO] = \frac{5}{4} \cdot \frac{3}{2}s = \frac{15}{8}s;$$

$$\frac{[BOM]}{[OMC]} = \frac{2}{1}, \text{ тогда } [OMC] = \frac{1}{2}[BOM] = \frac{1}{2} \cdot \frac{15}{8}s = \frac{15}{16}s.$$

- 2) Тогда

$$[AOB] = s + \frac{3}{2}s = \frac{5}{2}s = \frac{40}{16}s$$

$$[BOC] = \frac{15}{8}s + \frac{15}{16}s = \frac{45}{16}s$$

- 3) А также $[KBM] = \frac{27}{8}s$, с другой стороны $[KBM] = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{3} \cdot [ABC]$, т.е. $[ABC] = \frac{5}{2} \cdot \frac{27}{8}s$.

- 4) Тогда $[AOC] = [ABC] - [AOB] - [BOC] = \frac{50}{16}s$.

Ответ. ABO .